

Octenisept[®] Wunddesinfektion

- **Zusammensetzung :** 100g Lösung enthalten :
Arzneilich wirksame Bestandteile : Octenidindihydrochlorid 0,1g, Phenoxyethanol 2,0g
Sonstige Bestandteile : (3-Cocofettsäureamidopropyl)dimethylammonioacetat,
Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser

- **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung

- **Gegenanzeigen:** Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Octenisept Wunddesinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden.

- **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten.

- **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Octenisept Wunddesinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion , gelangen lassen. Bei Säuglingen sollte Octenisept Wunddesinfektion nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.

- **Pharmazeutischer Unternehmer :**
Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.