

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Calcium-Sandoz® forte 500 mg

Zusammensetzung

1 Brausetablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

2,94 g Calciumlactogluconat	} entsprechend 500 mg Calciumionen
0,30 g Calciumcarbonat	

Sonstige Bestandteile:

Citronensäure; Natriumhydrogencarbonat; Sorbitol (647 mg = 0,05 BE);
Macrogol 4000; Natriumcyclamat; Orangen-Aroma.

Hinweis für Diabetiker:

Calcium-Sandoz forte 500 mg ist zuckerfrei und deshalb auch für Diabetiker geeignet.

Darreichungsform und Inhalt

20 Brausetabletten/N1

40 Brausetabletten/N2

100 Brausetabletten/N3

Klinikpackung

Mineralstoffpräparat

Novartis Consumer Health GmbH

✉ 81366 München

📍 Zielstattstraße 40, 81379 München

☎ Telefon (089) 78 77-0

📠 Telefax (089) 78 77-444

Anwendungsgebiete

Erhöhter Calciumbedarf während der Schwangerschaft, der Stillzeit und des Wachstums; Allergien; Mineralisationsstörungen des Knochens wie Rachitis, Knochenerweichung (Osteomalazie) in der Heilphase, Knochengewebsschwund (Osteoporose).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Calcium-Sandoz forte 500 mg nicht anwenden?

Calcium-Sandoz forte 500 mg darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. Bei zu hohen Calciumkonzentrationen im Blut dürfen Sie Calcium-Sandoz forte 500 mg nicht einnehmen. Eine Erhöhung der Calciumkonzentration tritt regelmäßig auf bei einer Überfunktion der Nebenschilddrüse (Hyperparathyreoidismus).

Sie kann ebenfalls vorliegen bei

- Vitamin D-Überdosierung,
- Kalkziehenden Tumoren wie paraneoplastisches Syndrom, Knochenmetastasen,
- bestimmten Lungenerkrankungen (Sarkoidose, Morbus Boeck),
- Knochengewebsschwund nach erzwungener Ruhigstellung (Immobilisationsosteoporose im akuten Schub).

Wann dürfen Sie Calcium-Sandoz forte 500 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Calcium-Sandoz forte 500 mg nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Sie sollten Calcium-Sandoz forte 500 mg nur mit besonderer Vorsicht und unter ärztlicher Kontrolle einnehmen:

- bei eingeschränkter Nierenfunktion,
- bei Nierenstein und Nierenverkalkung (Nephrocalcinose),
- bei vermehrter Calciumausscheidung im Urin (Hypercalciurie),
- bei erniedrigter Phosphatkonzentration im Blut (Hypophosphatämie).

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Sorbitol ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden erblichen Fructose-Unverträglichkeit (hereditäre Fructoseintoleranz).

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Calcium-Sandoz forte 500 mg.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Bei leicht erhöhter Calciumausscheidung im Urin (leichte Hypercalciurie über 300 mg = 7,5 mmol in 24 Stunden), bei leichten oder mäßigen Störungen der Nierenfunktion oder bei Harnsteinen in der Vorgeschichte sollte die Calciumausscheidung regelmäßig kontrolliert bzw. der Calciumspiegel des Blutes überwacht werden. Gegebenenfalls sollte die Calciumdosis vermindert oder die Behandlung abgebrochen werden. Patienten, die zur Bildung von Steinen in den ableitenden Harnwegen neigen, wird reichliche Flüssigkeitsaufnahme empfohlen.

Bei Personen, die auf eine natriumarme Diät achten müssen, ist der Natriumgehalt des Arzneimittels zu berücksichtigen (siehe Dosierungsanleitung).

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Calcium-Sandoz forte 500 mg?

- Vitamin D steigert die Wirkung von Calcium-Sandoz forte 500 mg (Resorptionssteigerung). Von einer Kombinationsbehandlung mit hohen Vitamin D-Dosen wird abgeraten (außer bei spezieller Indikationsstellung, wie z. B. Vitamin D-Mangelerscheinungen), weil bei normalem Vitamin D-Status die zusätzliche Gabe von Vitamin D zu erhöhten Calcium-Blutspiegeln führen kann.
- Bestimmte harntreibende Mittel (Diuretika vom Thiazid-Typ) vermindern die Calciumausscheidung. Bei gleichzeitiger Einnahme von Calcium-Sandoz forte 500 mg und solchen Arzneimitteln sollte deshalb der Calcium-Blutspiegel überwacht werden.

Wie beeinflusst Calcium-Sandoz forte 500 mg die Wirkung von anderen Arzneimitteln?

Wenn durch die Einnahme von Calcium-Sandoz forte 500 mg der Calcium-Blutspiegel steigt, wird die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Arzneimitteln, die die Herzkraft steigern (herzwirksame Glykoside), erhöht und das Risiko von Herzrhythmusstörungen gesteigert. Die Resorption von Aluminium- und Bismutsalzen und damit auch deren Toxizität wird durch die in Calcium-Sandoz forte 500 mg enthaltene Citronensäure gesteigert.

Die Resorption und damit auch die Wirksamkeit von verschiedenen Antibiotika wie z. B. Tetracyclinen, Chinolonen, einigen Cephalosporinen sowie vielen anderen Arzneimitteln (z. B. dem Pilzmittel Ketoconazol, Eisen-, Natriumfluorid-, Estramustin, Bisphosphonatpräparaten) wird durch die gleichzeitige Einnahme von Calcium-Sandoz forte 500 mg vermindert.

Zwischen der Einnahme von Calcium-Sandoz forte 500 mg und der Einnahme anderer Präparate sollte daher in der Regel ein Abstand von mindestens 2 Stunden eingehalten werden.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Calcium-Sandoz forte 500 mg nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Calcium-Sandoz forte 500 mg sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Calcium-Sandoz forte 500 mg und wie oft sollten Sie Calcium-Sandoz forte 500 mg anwenden?

Erwachsene nehmen 2- bis 3-mal täglich 1 Brausetablette, Kinder je nach Alter 1- bis 2-mal täglich 1 Brausetablette.

Wie und wann sollten Sie Calcium-Sandoz forte 500 mg anwenden?

Die Brausetabletten sind in einem Glas Wasser gelöst einzunehmen.

Wie lange sollten Sie Calcium-Sandoz forte 500 mg anwenden?

Eine bestimmte Begrenzung der Anwendungsdauer ist nicht vorgesehen. Zur Beachtung bei natriumdefinierter (natriumarmer) Diät: 1 Brausetablette enthält 288,3 mg Natrium.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Calcium-Sandoz forte 500 mg in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Ernste akute Vergiftungen durch Calcium-Sandoz forte 500 mg sind nie bekannt geworden.

Nach Einnahme extrem hoher Dosen können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Calcium-Sandoz forte 500 mg angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Unterbrechen Sie die Behandlung oder beenden Sie die Anwendung vorzeitig, so müssen Sie damit rechnen, dass sich die gewünschte Wirkung nicht einstellt bzw. das Krankheitsbild sich wieder verschlechtert. Nehmen Sie deshalb bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie die Behandlung beenden oder unterbrechen wollen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Calcium-Sandoz forte 500 mg auftreten?

In seltenen Fällen können leichte Magen-Darm-Störungen (Aufstoßen, Verstopfung oder Durchfall) auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Röhrchen aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Calcium-Sandoz forte 500 mg aufzubewahren?

Die Tablettenröhre ist trocken zu lagern und nach Gebrauch dicht zu verschließen.

Stand der Information

Juli 2004

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Liebe Patientin, lieber Patient,

durch die Umstellung unseres Produktionsverfahrens können wir Ihnen Calcium-Sandoz forte 500 mg nun ohne Einwickelfolie anbieten. Damit tragen wir dem Umweltschutzgedanken Rechnung und vereinfachen Ihnen die Einnahme unseres Produktes.

Die etwas flachere und stabilere Brausetablette ändert nichts an der Calcium-Sandoz Produktqualität.

 NOVARTIS