

**PRODUKTINFORMATION**

Inhaltsstoffe | Werbung | Produkt

Monapax® Saft

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Drosera Ø 0,02 g, Hedera helix Ø 0,04 g, China D1 0,02 g, Coccus cacti D1 0,04 g, Cuprum sulfuricum D4 2,0 g, Ipecacuanha D4 2,0 g, Hyoscyamus D4 2,0 g.

Sonstige Bestandteile:

Sorbitol, Xanthan Gum, Ethanol, Kaliumsorbat, Anisöl, Saccharin-Natrium, Citronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 150 ml Lösung (N1)

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungen der Atemwege.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Cassella-med

Gereonsmühlengasse 1

50670 Köln

Telefon: 0221/120157

Telefax: 0221/1652-513

E-Mail: cmed@cassella-med.de

Hersteller:

A. Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1

50829 Köln

Telefon: 0221/509-01

Telefax: 0221/509-2711

Anwendungsgebiete:

Husten jeder Ursache, auch Keuchhusten, Bronchialkatarrh.

Gegenanzeigen:**Wann dürfen Sie Monapax Saft nicht anwenden?**

Bei Überempfindlichkeit gegen Chinin sowie gegen einen der übrigen Inhaltsstoffe.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Keine Einschränkung bezüglich der Einnahme.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Monapax Saft enthält 3,9 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Monapax Saft nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Monapax Saft sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Monapax Saft und wie oft sollten Sie Monapax Saft anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen
Säuglinge ab dem 6. Monat 3 x tägl. 1/2 Teelöffel,
Kleinkinder 1-3 Jahre 4 x tägl. 1/2 Teelöffel,
Vorschulkinder über 3-7 Jahre 3 x tägl. 1 Teelöffel (5 ml),
Schulkinder 7-14 Jahre 3 x tägl. 2 Teelöffel,
Jugendliche 14-18 Jahre 4 x tägl. 2 Teelöffel,
Erwachsene 4 x tägl. 1 Eßlöffel (15 ml)
Saft ein.

Bei Keuchhusten ist die angegebene Dosis stündlich einzunehmen
bis zur Linderung, danach wie oben angegeben.

Wie und wann sollten Sie Monapax Saft anwenden?

Da die Wirkstoffe von Monapax Saft gut von der Mundschleimhaut
aufgenommen werden, sollte der Saft vor dem Herunterschlucken
für einige Zeit im Mund belassen werden.

Die Einnahme erfolgt über den Tag verteilt in möglichst
gleichmäßigen Zeitabständen.

Wie lange sollten Sie Monapax Saft anwenden?

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der therapeutischen
Notwendigkeit bzw. nach der Dauer der Erkrankung.

Hinweis für Diabetiker:

1 Teelöffel (5 ml) entspricht 0,075 BE und 1 Eßlöffel (15 ml)
entspricht 0,226 BE (Broteinheiten).
Physiologischer Brennwert: ca. 57,21 kJ = ca. 13,44 kcal pro 1
Eßlöffel.

Allgemeiner Hinweis:

Bei Naturstoff-Präparaten gelegentlich auftretende Nachtrübungen
oder Ausflockungen beeinträchtigen
nicht die Wirkung.
Vor Gebrauch schütteln!

Anwendungsfehler und Überdosierung:**Was ist zu tun, wenn Monapax Saft in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Auch bei Überdosierung sind aufgrund der Verdünnungsstufen
schädigende Effekte nicht zu erwarten.

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann
insbesondere bei Kindern zu einer
Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr,
weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei der Einnahme
des gesamten Flascheninhaltes von 150 ml werden etwa 4,7 g
Alkohol aufgenommen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Monapax Saft angewendet oder eine Einnahme vergessen haben?

Wenn Sie einmal eine Anwendung vergessen haben, so sollten Sie
diese möglichst bald nachholen
und dann mit der verordneten Dosierung fortfahren.

Nebenwirkungen:**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Monapax Saft auftreten?**

Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser
Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt
oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

In diesem Fall informieren Sie bitte Ihren Arzt, damit dieser die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.

Hinweis:

Nach Einnahmebeginn können sogenannte Erstverschlimmerungen auftreten, die jedoch ungefährlich sind.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Öffnen der Flasche ist Monapax Saft bei Raumtemperatur 6 Monate haltbar. Bitte verwenden Sie die angebrochene Packung nach dieser Frist nicht mehr.

Stand der Information:

April 2003

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Pflichttext:

Husten jeder Ursache, auch Keuchhusten, Bronchialkatarrh. Enthält 3,9 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

